

Written by Administrator
Tuesday, 03 April 2018 17:48 -

Numărul copiilor care suferă de autism a crescut în toată lumea, a declarat Liana Kobylinska, medic specialist în psihiatrie pediatrică la Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos".

Potrivit unui studiu realizat de medicii români în anul 2016, numărul copiilor diagnosticați cu tulburare de spectru autism internați în Departamentul de psihiatrie a copilului și adolescentului de la Spitalul "Obregia" a crescut de aproximativ 10 ori în peste 20 de ani.

"Este enorm și, din păcate, se aliniază peste trendul internațional de creștere a incidenței tulburării de spectru autist. La noi în spital am analizat datele din Centrul de Sănătate Mintală, unde în 2014 comparativ cu 2017 s-au prezentat de trei ori mai puțini copii la consultație care au primit acest diagnostic. Incidența crește, crește peste tot", a afirmat medicul, într-o conferință de presă.

Potrivit acesteia, la vârsta de opt ani deja nu mai există niciun dubiu cu privire la diagnostic.

Medicul a arătat că nu există o cauză certă identificată pentru tulburarea de spectru autist.

"Avem foarte multe ipoteze, nu avem o cauză certă identificată pentru tulburarea de spectru autism. Avem peste 150 de cauze genetice de modificări în ADN-ul uman care se asociază cu tulburări din spectrul autist. Avem ca și candidați metalele grele a căror influență pare să fie grăitoare în etiopatogenia tulburării de spectru. Dar nu avem o corelație directă, avem doar asocieri între ce au copiii în acest moment și faptul că au și în sânge metale grele. Mamele copiilor cu tulburare de spectru autist prezintă o floră bacteriană în intestinul lor care este particulară. Au anumite specii de bacterii, dar din nou toate aceste rezultate sunt mai degrabă niște descoperiri descriptive, adică au fost găsite la copiii diagnosticați deja cu tulburare de spectru și nu avem niciun rezultat prospectiv. Părinții copiilor cu tulburare de spectru autist au într-un procent foarte mare ei înșiși niște tare, tipare specifice de socializare. Tații pot fi mai hipersistemizați, mamele mai puțin empaticе, dar nu este o regulă, este doar o observație făcută pe majoritatea părinților copiilor cu tulburare de spectru autist", a explicat specialistul.

Ea a spus că un alt factor extrem de important este cel al existenței infecțiilor în primul trimestru de sarcină, mai ales al infecțiilor virale, care se asociază cu o incidență crescută a tulburării de spectru autist. AGERPRES