

Mai mult de 99% din cazurile de deces provocate de coronavirus în Italia au fost constatate la persoane care au suferit de afecțiuni medicale anterioare, potrivit unui studiu al autorității naționale de sănătate din peninsula.

După ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o creștere de 150% săptămâna trecută, autoritățile din domeniul sănătății au oferit date care să ofere indicii care să ajute la combaterea răspândirii bolii, scrie Bloomberg.

Guvernul premierului Giuseppe Conte evaluează dacă va extinde o blocare la nivel național dincolo de începutul lunii aprilie, a informat zilnic miercuri La Stampa. Italia are peste 31.500 de cazuri confirmate de boală.

Noul studiu ar putea oferi cunoștințe de ce rata de deces din Italia, estimată la aproximativ 8% din totalul persoanelor infectate, este mai mare decât în □□ alte țări.

Institutul de la Roma a examinat înregistrările medicale pentru aproximativ 18% din cazurile fatale, constatând că doar trei victime, sau 0,8% din total, nu aveau patologie anterioară. Aproape jumătate dintre victime sufereau de cel puțin trei boli anterioare și aproximativ o pătrime aveau una sau două afecțiuni anterioare. Peste 75% au avut hipertensiune arterială, aproximativ 35% au avut diabet și o treime au suferit de boli de inimă.

Advertisement

Vârsta medie a celor care au murit din cauza coronavirusului în Italia este de 79,5 ani. La 17 martie, 17 persoane sub 50 de ani au murit din cauza bolii. Toate victimele sub 40 de ani din Italia au fost bărbați cu afecțiuni medicale grave existente.

În timp ce datele publicate marți indică o încetinire a creșterii cazurilor, cu o creștere de 12,6%, un studiu separat arată că Italia ar putea subestima numărul real de cazuri prin testarea numai a pacienților care prezintă simptome.

Potrivit Fundației GIMBE, aproximativ 100.000 de italieni au contractat virusul, a informat Il Sole 24 Ore. Aceasta ar reduce rata de deces a țării mai aproape de media globală de aproximativ 2%.